

# cicloplégico

## cloridrato de ciclopentolato 1%

### FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Frasco plástico conta-gotas contendo 5 ml de solução oftálmica estéril.

### USO ADULTO E PEDIÁTRICO

### COMPOSIÇÃO

#### SOLUÇÃO OFTÁLMICA

1ml corresponde a 10 mg de cloridrato de ciclopentolato.

Veículo: ácido bórico, cloreto de potássio, edetato dissódico, carbonato de sódio, cloreto de benzalcônio, ácido clorídrico/hidróxido de sódio e água purificada q.s.p.

### INFORMAÇÃO AO PACIENTE

- Ação esperada do medicamento: dilatação da pupila e paralisação da acomodação.
- Cuidados de armazenamento: o produto deve ser armazenado a temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C) e ao abrigo da luz.
- Prazo de validade: vide cartucho. Não use medicamento com prazo de validade vencido.
- Gravidez e lactação: informe ao médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se estiver amamentando.
- Cuidados de administração: instile a dose recomendada, no saco conjuntival, evitando tocar a ponta do frasco nos tecidos oculares. O saco lacrimal deve ser comprimido durante 2 ou 3 minutos após a instilação do colírio. Lave as mãos após o uso do produto. Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.
- Interrupção do tratamento: não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.
- Reações adversas: informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

### TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

- Contra-indicações e precauções: informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento. É aconselhável não dirigir veículos ou executar tarefas perigosas enquanto as pupilas estiverem dilatadas.

### NÃO USE REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE

### Informação Técnica

O ciclopentolato é um agente anticolinérgico que bloqueia a resposta dos músculos do esfíncter da íris e do corpo ciliar à estimulação colinérgica, produzindo dilatação pupilar (midríase) e paralisia da acomodação (cicloplegia). Após instilação, o efeito máximo ocorre em 30 a 60 minutos e a recuperação total da acomodação visual ocorre normalmente em 24 horas ou em 3 a 6 horas com o uso de pilocarpina a 2%.

### Indicações

Midríase e cicloplegia. Adjuvante no estudo da refração ou na oftalmoscopia. Tratamento de distúrbios inflamatórios dos olhos: irite, iridociclite, ceratite e coroidite.

### Contra-Indicações

Glaucoma de ângulo estreito ou na presença de ângulo estreito anatômico. Hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

### Interações Medicamentosas

O uso concomitante com a pilocarpina interfere na sua ação antiglaucomatosa. O uso concomitante com os inibidores da colinesterase oftálmica pode antagonizar os efeitos desses medicamentos.

### Precauções e Advertências

O produto deve ser usado com cautela em pacientes idosos ou indivíduos em que a pressão intra-ocular possa estar aumentada. Para evitar a indução de glaucoma de ângulo estreito, é aconselhável avaliar a abertura do ângulo da câmara anterior. Para minimizar a absorção sistêmica, o saco lacrimal deve ser comprimido por 2 ou 3 minutos após a instilação da solução oftálmica. Lave as mãos após o uso do produto.

O uso em crianças requer extrema cautela. Observe atentamente a criança durante pelo menos 30 minutos após a instilação. O ciclopentolato pode afetar desfavoravelmente pacientes portadores de distúrbios cardiovasculares, hipertensão ou hipertireoidismo.

O paciente deve ser avisado para não dirigir veículos ou executar tarefas perigosas enquanto as pupilas estiverem dilatadas e a proteger os olhos da iluminação excessiva.

### Reações Adversas

Elevação da pressão intra-ocular. Ardência transitória ou sintomas de irritação ocular.

A absorção sistêmica pode resultar em efeitos atropínicos sobre o sistema nervoso central (ataxia, incoerência da conversação, agitação, hiperatividade, convulsão, desorientação de tempo e espaço).

Podem ocorrer também taquicardia, hiperpirexia, vasodilatação, retenção urinária, diminuição da motilidade intestinal e das secreções das glândulas salivares e sudoríparas.

### Posologia

Exclusivamente de acordo com indicação e critério médico. Uma ou duas gotas são geralmente suficientes para obter os efeitos desejados.

### Superdosagem

No caso de manifestações severas de toxicidade, adotar os procedimentos habituais para intoxicação atropínica. O antídoto de escolha é o salicilato de fisostigmina.

### Pacientes Idosos

Não existem restrições de uso para pacientes idosos. A posologia é a mesma que a recomendada para as outras faixas etárias.


Nº de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA  
SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA

MS - 1.0147.0131

Farm. Resp.: Dra. Flávia Regina Pegorer

CRF-SP nº 18.150



 **ALLERGAN**

**Qualidade e Tradição a Serviço da Oftalmologia**

ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

Av. Guarulhos, 3.272 - CEP 07030-000 - Guarulhos - SP

CNPJ 43.426.626/0009-24

Indústria Brasileira

**Texto adaptado à portaria 110/97**

72154BR10X - Laetus: 178

Serviço de Atendimento ao Consumidor

**0800-144077**

Discagem Direta Gratuita