

Colirio  
**LERIN®**

 **ALLERGAN**

## cloridrato de nafazolina 0,05% fenolsulfonato de zinco 0,1%

### FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Frasco plástico conta-gotas contendo 24 ml de solução oftálmica estéril.

### USO ADULTO

### COMPOSIÇÃO

#### SOLUÇÃO OFTÁLMICA

Cada ml contém: 1,0 mg de fenolsulfonato de zinco e 0,5 mg de cloridrato de nafazolina.

Veículo: sulfato de berberina, clorobutanol, cloreto de benzalcônio, citrato de sódio diidratado, cloreto de sódio, glicerina, hipromelose, ácido clorídrico/ hidróxido de sódio e água purificada q.s.p.

### INFORMAÇÃO AO PACIENTE

- Ação esperada do medicamento: ação vasoconstritora, sedativa e descongestionante nas hiperemias conjuntivais.
- Cuidados de armazenamento: o produto deve ser armazenado a temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C) e ao abrigo da luz. Após a abertura do frasco, não tocar a ponta do mesmo a fim de evitar contaminações. Fechar o frasco imediatamente após o uso.
- Prazo de validade: vide cartucho. Não use produto com prazo de validade vencido.
- Gravidez e lactação: informar seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar ao médico se estiver amamentando.
- Cuidados de administração: instile a dose recomendada, no saco conjuntival, evitando tocar a ponta do frasco nos tecidos oculares. Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.
- Interrupção do tratamento: não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.
- Reações adversas: informar ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

### TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

- Contra-indicações e precauções: contra-indicado para os pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

**NÃO USE REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE**

### Informação Técnica

Lerin® representa uma medicação de interesse oftalmológico nas hiperemias conjuntivais provocadas por irritantes locais: corpos estranhos, poeiras, vento, fumo, exposição à luz intensa e na congestão que acompanha a coriza aguda.

Contém a associação de 2 substâncias de real interesse no setor oftalmológico:

- o fenolsulfonato de zinco, da mesma forma que o sulfato de zinco, envolve a precipitação de proteínas, causada pelo íon zinco, auxiliando na remoção do muco da superfície ocular.
- o cloridrato de nafazolina hoje é largamente empregado em oftalmologia devido a sua ação vasoconstritora.

### Indicações

Medicação auxiliar no tratamento das conjuntivites.

### Contra-Indicações

Hipersensibilidade aos componentes da fórmula, glaucoma de ângulo estreito ou predisposição ao mesmo.

### Precauções e Advertências

Não são necessárias precauções especiais no uso do produto.

### Interações Medicamentosas

Não são conhecidas interações com outros medicamentos.

### Reações Adversas

Em doses excessivas e uso prolongado: hiperemia ocular, visão turva, pupilas dilatadas, cefaléia, nervosismo, náuseas, aumento da sudorese.

### Posologia

Instilar 1 a 2 gotas em cada olho, de 2 em 2 horas.

### Superdosagem

Em geral, superdosagens não provocam problemas agudos. Para excesso de produto instilado no olho, lavar com água ou soro fisiológico. Se acidentalmente for ingerido, beber bastante líquido para diluir ou procurar orientação médica.

### Pacientes Idosos

Não existem restrições de uso em pacientes idosos. A posologia é a mesma que a recomendada para as outras faixas etárias.

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURAR ORIENTAÇÃO MÉDICA**

Nº de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho.

Reg. ANVISA/ MS - 1.0147.0031

Farm. Resp.: Dra. Flávia Regina Pegorer

CRF-SP nº 18.150



**Qualidade e Tradição a Serviço da Oftalmologia**

ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

Av. Guarulhos, 3.272 - CEP 07030-000 - Guarulhos -SP

CNPJ 43.426.626/0009-24

Indústria Brasileira

® Marca Registrada

**Texto adaptado à portaria 110/97**

71890BR11X - Laetus: 175

Serviço de Atendimento ao Consumidor

**0800-144077**

Discagem Direta Gratuita