

Refresh® Gel

ácido poliacrílico 0,3%

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Tubo contendo 10g de gel oftálmico estéril.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

GEL OFTÁLMICO

Cada 100g contém: 0,3g de ácido poliacrílico.

Veículo: cloreto de benzalcônio, sorbitol, hidróxido de sódio e água purificada q.s.p..

INFORMAÇÃO AO PACIENTE

- Ação esperada do medicamento: ação lubrificante e umectante.
- Cuidados de armazenamento: o produto deve ser conservado em temperatura ambiente (15°C e 30°C).
- Prazo de validade: vide cartucho. O tubo deve ser descartado após 30 dias de sua abertura. Não use medicamento com prazo de validade vencido.
- Gravidez e lactação: informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se estiver amamentando. Não foi estabelecida a segurança do produto nesses períodos; portanto, use somente quando for prescrito pelo médico.
- Cuidados de administração: aplique a dose recomendada no saco conjuntival, evitando tocar a ponta do tubo nos tecidos oculares. Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.
- Interrupção do tratamento: não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.
- Reações adversas: informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

- Contra-indicações e precauções: informe ao médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE

Informação Técnica

Refresh® Gel (ácido poliacrílico) contém um polímero hidrofílico de alto peso molecular. O gel forma uma película transparente, lubrificante e úmida na superfície do olho e possui pH e osmolalidade similar às encontradas no fluido lacrimal normal.

Refresh® Gel (ácido poliacrílico) alivia os sintomas de irritação relacionados com a síndrome do olho seco e protege a córnea contra a desidratação.

O tempo de permanência do gel na superfície ocular é maior do que o das lágrimas artificiais de baixa viscosidade, o que resulta em uma maior duração dos efeitos contra os sintomas, diminuindo a frequência de administração.

O uso deste medicamento promoveu melhoras nas lesões de córnea e de epitélio associadas à síndrome do olho seco.

Indicações

Em casos de síndrome de Sjögren; alta secura por ressecamento da córnea e conjuntiva de origem senil, menopausa ou pós-menopausa; piscar pouco frequente (como por exemplo, durante anestesia ou coma profundo); fechamento insuficiente da pálpebra ou sensibilidade reduzida da córnea.

As propriedades físico-químicas do gel permitem que atue como uma superfície protetora formando uma película transparente, lubrificante e úmida na superfície do olho. A formulação possui pH e osmolalidade similares aos encontrados no fluido lacrimal normal.

Contra-Indicações

Refresh® Gel (ácido poliacrílico) é contra-indicado para pacientes que tenham hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

Precauções e Advertências

Não utilize lentes de contato durante a aplicação.

Este medicamento só deve ser usado por uma única pessoa. Nunca forneça para outra pessoa, mesmo que tenha os mesmos sintomas. Caso você tenha qualquer dúvida sobre este produto, pergunte ao seu médico ou ao farmacêutico. Não utilize este produto por tempo prolongado. Após um breve período de tratamento, sem resultados apreciáveis, consulte um médico.

Interações Medicamentosas

Evite o uso concomitante de outros produtos como anti-sépticos oculares. No caso de outros tratamentos oculares (como, por exemplo, o de glaucoma) deve-se respeitar um intervalo mínimo de 5 minutos entre as aplicações dos medicamentos.

Reações Adversas

Refresh® Gel (ácido poliacrílico) é bem tolerado. Podem ocorrer casos de intolerância como coceira, irritação e/ou adesão das pálpebras. Logo após a aplicação, pode


ocorrer um leve borramento da visão, devido a densidade do gel; este borramento desaparece muito rapidamente.

Posologia

Administração: adultos (incluindo idosos) e crianças - uma gota instilada no saco conjuntival, uma a duas aplicações ao dia com o máximo de quatro para os casos com sintomas mais intensos.

Modo de Usar

1. Lave as mãos.
2. Remova a tampa e incline sua cabeça.
3. Durante a aplicação, mantenha o tubo perpendicular e não oblíquo, por que somente assim se obtém uma gota regular, conforme figura abaixo.



Correto



Incorreto

4. Segure o tubo acima do seu olho com uma mão e puxe suavemente a pálpebra inferior com a outra.
5. Aperte o tubo de modo que uma gota do gel caia no espaço entre a pálpebra inferior e o olho.
6. Solte a pálpebra inferior.
7. Tenha cuidado para não tocar nenhuma superfície com a ponta do tubo.
8. Lembre-se de fechar o tubo após a aplicação.

Efeitos na habilidade de uso de máquinas

Pode ocorrer um borramento transitório da visão, até que o gel esteja uniformemente distribuído na superfície do olho.

Alerte os pacientes para que não dirijam ou operem equipamento perigoso até que a visão se normalize.

Superdosagem

Em geral, superdosagens não provocam problemas agudos. Se acidentalmente, for ingerido, beba bastante líquido para diluir, ou procure orientação médica.

Pacientes Idosos

Não existem restrições de uso em pacientes idosos. A posologia é a mesma que a recomendada para as outras faixas etárias.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

Nº de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho.

Reg. ANVISA/MS - 1.0147.0146

Farm. Resp.: Dra. Flávia Regina Pegorer

CRF-SP nº 18.150

ALLERGAN

Qualidade e Tradição a Serviço da Oftalmologia

Fabricado por: Farmila - Thea Farmaceutici S.P.A.
Via E. Fermi, 50 - 20019
Settimo Milanese - Milão - Itália

Sob Licença: Laboratoires Théa
12 Rue Louis-Blériot
62100 Clermont Ferrand - França

Importado, embalado e distribuído por:
Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Guarulhos, 3.272 - CEP 07030-000 - Guarulhos - SP
CNPJ 43.426.626/0009-24
Indústria Brasileira
® Marca Registrada

Texto adaptado à Portaria 110/97

72222BR10A - Laetus 200

Serviço de Atendimento ao Consumidor
0800-144077
Discagem Direta Gratuita